

ALGEMENE SLEUTEL

- Bloemen alleenstaand of 2-4 per bloeiwijze; stengel liggend tot liggend-opstijgend; stengelbladen 1-2 of ontbrekend; hoogte 3-15 cm **Eénbloemige veldkers**
- Bloemen minstens 5 per bloeiwijze; stengel rechtopstaand
 - + Onderste bladen met 7-13 blaadjes; stengelbladen met 11-15 blaadjes; stengel onderaan behaard; rijpe hauwen vormen hoek met steeltje; stekken niet (of nauwelijks boven bloemen uit) **Bosveldkers**
 - + Onderste bladen (rozet) met 3-7 blaadjes; stengelbladen met 5-11 blaadjes; stengel kaal; rijpe hauwen geen hoek met steeltje; stekken duidelijk boven bloemen uit **Kleine veldkers**

Opmerking :

De **Eénbloemige veldkers** (*Cardamine corymbosa*) is een nieuwkomer in sierteelt-bedrijven en tuinen . De soort lijkt vegetatief op de **Kleine veldkers**. Kleine planten zijn dikwijls gereduceerd tot een bladrozet met een bundeltje van 1-3 langgesteelde bloemen. Deze plant is afkomstig van Nieuw-Zeeland en werd voor het eerst opgemerkt in Waregem in 1999. Sindsdien verspreidt ze zich verder en is ze waargenomen op veel plaatsen in Vlaanderen.

Kleine veldkers (*Cardamine hirsuta*)

Familie

kruisbloemenfamilie (*Brassicaceae*)

Diagnostische kenmerken

Meeldraden 4, soms 5, zelden 6.

Slippen van de stengelbladen meestal gaafrandig.

Stengels meestal met 2-4 bladen, meestal kaal.

Bloemstelen 2-3 mm lang.

Vruchten duidelijk boven de bloemen uitstekend, 1,5-2,5 cm lang.

Hoogte bloeiende plant

5 – 25 cm.

Bloeitijd

Maart - mei

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)


Standplaats

Bouwland, hellingen, oude muren, wegbermen.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	301	301
●	1995 - ...	319	319



Bosveldkers (*Cardamine flexuosa*)

Familie

kruisbloemenfamilie (*Brassicaceae*)

Diagnostische kenmerken

Meeldraden 4, soms 5, zelden 6.

Slippen van de stengelbladen meestal gaafrandig.

Stengels meestal met 2-4 bladen, meestal kaal.

Bloemstelen 2-3 mm lang.

Vruchten duidelijk boven de bloemen uitstekend, 1,5-2,5 cm lang.

Hoogte bloeiende plant

10 – 40 cm.

Bloeitijd

April - juli

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)

Standplaats

Nogal vochtige bossen, rotsen.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	29	29
●	1995 - ...	136	136



Eénbloemige veldkers (*Cardamine corymbosa*)

Familie

kruisbloemenfamilie (*Brassicaceae*)

Diagnostische kenmerken

Planten overblijvend, met een zeer kleine knol en lange wortels. Wortelbladen met 1-7 blaadjes, vaak bruin aangelopen.

Stengel meestal onbebladerd, meestal 1-bloemig.

Kroonbladen 2-3 mm breed.

Hoogte bloeiende plant

3 – 10 cm.

Bloeitijd

Maart - juni

Levensvorm

Geofyt (winterknoppen onder de grond)

Standplaats

Recent als onkruid op stenige open grond in (rots)tuinen. Oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970		
●	1971-'94		
●	1995 - ...		

Geen gegevens.